quième, Lacordaire et après lui Gemminger et Harold ont cru devoir ranger cette espèce dans le genre *Compsocerus*; il y a là une double erreur que C. Berg (*An. Soc. cient. Argentina,* [1886], p. 238) a avec juste raison signalée.

Mulsant, dans sa description de *C. Brullei,* ne fait pas mention de la touffe de poils en question. Or il ne reste actuellement au *type* qu'une antenne brisée et réduite à ses trois premiers articles. L'insecte étant très vraisemblablement déjà dans cet état quand il a été étudié par Mulsant, l'omission d'un caractère si remarquable s'explique tout naturellement. Les autres différences qu'il signale entre *C. Brullei* et *C. gracilis* sont d'ailleurs exactes; les élytres plans en dessus et à bords parallèles ne sont ni rétrécis ni déhiscents à la suture en arrière; les fémurs postérieurs sont longuement pédonculés et brusquement renflés à leur extrémité en une massue ovalaire; seules la livrée et la forme du corselet des deux espèces ont une certaine analogie.

La synonymie de l'insecte qui fait l'objet de cette note doit s'établir de la façon suivante :

Cosmosoma Brullei Muls. 1862-3, Col. Fr., Longic., ed. 2, p. 215.
— Lacord., 1869, *Gen. Col.*, VIII, p. 489, note 2.
Callimoxys Brullei Muls., Lacord., loc. cit.
Cosmosoma nodicolle Burmeister 1865, *Stett. Zeit.*, [1865], p. 171. — Berg, *An. Soc. cient. Argent.*, [1886], p. 238.
Compsocerus nodicollis Lacord. 1869, Gen. Col., IX, 1, p. 37, note 3. — Cat. Gemming. et Har., 1872, IX, p. 2914.
Cosmosoma tenellum Mannerh., in litt., Cat. Dej., 1837, ed. 3, p. 350.
Cosmosoma aereipenne Chevrol. in litt.

Description d'une nouvelle espèce de *Drilidae* [Col.]

par Ernest Olivier.

M. le Dr L. von Heyden m'a envoyé récemment deux individus remarquables de *Drilidae* qui constituent une espèce nouvelle rentrant dans le genre *Phrixothrix* (*Bull. Soc. ent. Fr.* [1909], p. 344). J'en donne ici la description et suis heureux de la dédier à notre savant collègue qui a bien voulu enrichir ma collection d'un des deux exemplaires qu'il m'a communiqués.

Phrixothrix Heydeni, n. sp. — *Elongata, oblonga, longis setis undique vestita: capite nigro, fossulato, sparsim profunde punctato; mandibulis piceis, arcuatis, acutis; antennis et palpis piceis; oculis nigris, magnis, extus valde productis; prothorace rufo, aurantiaco, antice rotundato, impunctato, prope basim biimpresso, angulis posticis acutis, retro autem non productis, scutello parvo, subquadrato, rufo; elytris atris, nitidis, prothorace vix latioribus, abdominis segmentum tertium haud ultra prolongatis; dehiscentibus, rugosulis; alis longis, nigris; pectore et pedibus rufis, ventre piceo, septimo segmento leviter emarginato, ultimo triangulari, acuto.*

Long. 15 mill.

Paraguay : San Bernardino (coll. Senckenberg).

Cette curieuse espèce est hérissée de poils encore plus longs que ceux de *P. hirtus*; ces poils sont de la couleur de la partie du corps qu'ils recouvrent : noirs sur les antennes, la tête, les élytres, l'abdomen; roux sur le prothorax, la poitrine et les jambes. M. L. von Heyden m'écrit que cet insecte est lumineux de son vivant; mais je n'ai pu constater la présence d'aucun indice d'un appareil phosphorescent.

Description d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce de Goliathide d'Asie [Col. Scarabaeidae]

par Gaston Seillière.

Herculaisia, nov. gen. — *Corpus postice parum attenuatum, supra infraque fere ubique pilis squamiformibus indutum, in vestituram tegumenta obtendentem crescentibus. Elytra ad marginem externum juxta humeros ita insecata ut epimera metathoracica sint desuper conspicua. Pronotum pulvinatum, apud utrumque sexum inerme, ad basim recte secatum, antice sat regulariter rotundatum, postice non coarctatum: lateribus marginatis. Scutellum latum, triangulare. Caput apud marem appendiculo bifurcato productum, cum duobus cornibus juxta oculos sitis; fronte depressa. Tibiae anticae tricarinatae, cum margine externo inermi apud marem; tarsis anterioribus tibiis longioribus.*

Corps peu rétréci en arrière, en grande partie recouvert en dessus et en dessous d'une vestiture de poils squameux, masquant en partie les téguments. Bord externe des élytres échancré au-dessous des